



منازل خود را برای پیشگیری از مسمومیت‌ها ایمن‌سازی کنید

طبق گزارش سازمان‌های ذیربط از جمله پزشکی قانونی بیشترین درصد مسمومیت‌ها، مسمومیت ناشی از مونواکسیدکربن و مسمومیت‌های دارویی است و لازم است هموطنان برای پیشگیری از ابتلا به مسمومیت نحوه استفاده و نگهداری صحیح فرآورده‌های دارویی و جلوگیری از مسمومیت با مونواکسیدکربن را بیاموزند.

طبق گزارش سازمان‌های ذیربط از جمله پزشکی قانونی بیشترین درصد مسمومیت‌ها، مسمومیت ناشی از مونواکسیدکربن و مسمومیت‌های دارویی است و لازم است هموطنان برای پیشگیری از ابتلا به مسمومیت نحوه استفاده و نگهداری صحیح فرآورده‌های دارویی و جلوگیری از مسمومیت با مونواکسیدکربن را بیاموزند. مردم با دریافت آموزش عمومی نحوه استفاده از داروها و مواد شیمیایی محیط زندگی خود را برای پیشگیری از مسمومیت‌ها در کودکان ایمن‌سازی کنند.

به گزارش وب‌دا مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها ضمن بیان این مطلب گفت: طبق گزارش سازمان‌های ذیربط از جمله پزشکی قانونی بیشترین درصد مسمومیت‌ها، مسمومیت ناشی از مونواکسیدکربن و مسمومیت‌های دارویی است و لازم است هموطنان برای پیشگیری از ابتلا به مسمومیت نحوه استفاده و نگهداری صحیح فرآورده‌های دارویی و جلوگیری از مسمومیت با مونواکسیدکربن را بیاموزند.

بنابراین گزارش استفاده از ظرف Chid proof در بسته‌بندی‌های دارویی و شیمیایی، الصاق برچسب کامل بر روی بسته‌بندی مواد شیمیایی و شوینده (شامل اجزای سازنده فرآورده و نحوه برخورد با مسمومیت اتفاقی با آن)، همکاری در جایگزینی سموم بسیار خطرناک با سموم با خطر کمتر در مصارف خانگی اقدامات دیگر در جهت کاهش بروز مسمومیت‌ها در افراد جامعه هستند.