



مصرف افراطی کرم ضد آفتاب، احتمال ابتلا به راشیتیسم را افزایش می‌دهد

متخصصان انگلیسی در یک مطالعه جدید هشدار دادند که استفاده بیش از اندازه از کرم‌های قوی ضد آفتاب خطر ابتلا به راشیتیسم را در پی دارد.

سلامت نیوز : متخصصان انگلیسی در یک مطالعه جدید هشدار دادند که استفاده بیش از اندازه از کرم‌های قوی ضد آفتاب خطر ابتلا به راشیتیسم را در پی دارد.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، تیلر آتریل دختر 12 ساله‌ای است که به تازگی به بیماری راشیتیسم مبتلا شده و پزشکان علت آن را استفاده بیش از اندازه کرم‌های ضد آفتاب دانسته‌اند. این دختر نوجوان انگلیسی در ابتدا دچار دردهای شدید در ناحیه پاهای خود شده بود که پس از معاینه دقیق پزشکان علت آن را کمبود شدید ویتامین D و در نهایت ابتلا به راشیتیسم عنوان کردند.

بیماری راشیتیسم موجب تغییر شکل غیرطبیعی پاها می‌شود که در آن پاها شکل پرانتزی به خود می‌گیرند و سابقه این بیماری به دوران قرن نوزدهم باز می‌گردد که کودکان در خانه‌های تاریک و بدون نور بزرگ می‌شدند.

مادر تیلر یک پرستار 36 ساله است که برای مراقبت از سلامت پوست دختر خود قبل از خروج وی از خانه پوست او را به مقادیر زیادی از کرم‌های ضد آفتاب با SPF50 آغشته می‌کرده است. این در حالی بود که هوای بیرون از منزل گرم و آفتابی نبود اما به دلیل محرومیت زیاد این دختر از نور آفتاب و مراقبت‌های افراطی، پزشکان بیماری وی را راشیتیسم تشخیص دادند.

پروفیسور نیکلاس کلارک جراح مشاور ارتوپد در بیمارستان عمومی سوتامپتون در این باره خاطرنشان کرد: آنچه درباره این دختر نوجوان اتفاق افتاده بسیار تعجب آور است اما بدیهی است عدم تماس نور آفتاب با پوست او به علت مصرف زیاد کرم‌های ضد آفتاب با SPF بالا عامل اصلی این مشکل است.