


سیگار مهمترین عامل سرطان حنجره است



پزشك متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: سیگار مهمترین عامل سرطان حنجره در ایران است.

جام جم آنلاین: پزشك متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: سیگار مهمترین عامل سرطان حنجره در ایران است. علی گلجانیان تبریزي در گفت و گو با ایرنا افزود: مواد مضر سیگار ، موجب درگیری قسمت میانی حنجره شده و می تواند منجر به سرطان حنجره شود.

وی، خشونت و تغییر صدا، اشکال در تنفس، سرفه و برآمدگی گلو را از جمله نشانه های سرطان حنجره برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص و مراجعه به موقع ، می توان حنجره را حفظ کرد در غیر اینصورت ناگزیر ، حنجره برداشته می شود و فرد صدای خود را از دست می دهد.

این پزشك متخصص گفت: اغلب بیماران سرطانی نیز ناگزیرند برای صحبت کردن از ابزارهای کمکی مانند الکترولارینکس استفاده کنند که دارای اشکالاتی مانند طبیعی نبودن صدا یا نیاز به تعویض است.

«#171& تبریزي» با اشاره به لزوم تمرین و ممارست برای توانایی صحبت کردن با این ابزارها افزود: استفاده از این ابزارها علاوه بر نیاز به بستری شدن، هزینه بر است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر شیوع کم سرطان حنجره در مقایسه با سایر سرطان ها یادآور شد: میانگین سنی ابتلا به سرطان حنجره در جهان 55 تا 65 سال است، در حالیکه میانگین سنی افراد مبتلا به این بیماری در ایران 45 سال است.