



وزوز گوش را جدی بگیرید/ارتباط ۸۰ درصد سرگیجه ها با شنوایی

دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران، گفت: اگر وزوز گوش ادامه یابد، باید حتماً توسط پزشک و شنوایی شناسان بررسی شود.

دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران، گفت: اگر وزوز گوش ادامه یابد، باید حتماً توسط پزشک و شنوایی شناسان بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جلیوند روز دوشنبه در نشست خبری شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران که قرار است از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۶ در محل هتل المپیک تهران برگزار شود، اظهار داشت: شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

وی افزود: شنوایی شناسی ایران ادامه داد: شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران ادامه داد: شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

جلیوند در ارتباط با وزوز گوش گفت: همه افراد شاید تجربه وزوز گوش را داشته باشند ولی این مسئله زمانی حائز اهمیت بوده که وزوز گوش ادامه یابد و باید حتماً این موضوع توسط پزشکان و شنوایی شناسان بررسی شود و در واقع انجام تست شنوایی ضرورت دارد چرا که ممکن است یک اختلال شنوایی سبب بروز این مشکل شده باشد.

وی با بیان اینکه وزوز گوش در گاهی مواقع قابل پیشگیری است گفت: شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران ادامه داد: بر اساس برخی آمارها ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت فعال تجربه وزوز گوش را داشته ولی آمار پاتولوژیکی در ایران در این زمینه نداریم ولی افرادی که در مشاغل همچون محیط شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

جلیوند در مورد ترشح زیاد جرم گوش، گفت: برخی از افراد ژنتیکی دچار این مشکل بوده همچون زمانی که شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

وی افزود: زمانی که جرم گوش انباشته و سفت شود هنگامی که فرد حمام رفته یا به استخر می رود این مواد حجیم شده و سبب اختلال در شنوایی آن می شود.

دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران گفت: این افراد بهتر است هر ۵ ماه یکبار به متخصص مراجعه کرده و جهت شستشوی گوش اقدام کنند همچنین باید توجه داشت که استفاده از گوش شنوایی شناسان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، موسیقی با صدای بلند و مصرف مشروبات الکلی افراد را در معرض کم شنوایی قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: ۸۰ درصد سرگیجه ها ریشه در شنوایی افراد دارد و زمانی که فرد دچار سرگیجه می شود حتماً باید آزمایش شنوایی از آن صورت گیرد. البته موضوع سرگیجه در زنان به دلیل تغییرات هورمونی و ضعف بدنی بیشتر است.