



داروهای مسکن احتمال حمله قلبی را افزایش می‌دهند

مطالعات جدید نشان می‌دهد: مصرف مسکن‌های رایج از قبیل ایبوپروفن احتمال حمله قلبی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و این خطر در هفته و ماه اول بیشتر است.

مطالعات جدید نشان می‌دهد: مصرف مسکن‌های رایج از قبیل ایبوپروفن احتمال حمله قلبی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و این خطر در هفته و ماه اول بیشتر است.

به گزارش ایرنا از تلگراف، نتیجه یک مطالعه بزرگ با بررسی اطلاعات پزشکی بیش از 446 هزار نفر نشان می‌دهد: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی با افزایش احتمال بیماری‌های قلبی مرتبط هستند. هنوز دلیل قطعی این ارتباط مشخص نیست؛ ولی محققان احتمال می‌دهند این داروها هورمونی به نام prostacyclin را مسدود می‌کنند، نقش این هورمون محافظت از رگ‌های خونی است.

این مطالعه نشان می‌دهد احتمال حمله قلبی در هفته و ماه اول مصرف مسکن‌های غیر استروئیدی ضد التهابی بسیار زیاد است؛ ولی در صورت ادامه دارو، این میزان در ماه‌های دیگر افزایش نمی‌یابد؛ از طرفی احتمال حمله قلبی با افزایش دوز دارو افزایش می‌یابد.

نتایج این مطالعه نگران کننده است و محققان معتقدند بیماران باید از عوارض این داروها مطلع باشند و تاجایی که امکان دارد داروهای دیگری جایگزین شود.

نتایج این مطالعه در نشریه British Medical Journal منتشر شده است.