

تداوم تاثیر مضر سیگار کشیدن دوره بارداری بر سلامت کودک

سیگار کشیدن در طول بارداری با تاثیرات بسیاری بر سلامت و تولیدمثل و همچنین سلامت عمومی بدن مرتبط است.



سیگار کشیدن در طول بارداری با تاثیرات بسیاری بر سلامت و تولیدمثل و همچنین سلامت عمومی بدن مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که استعمال توتون و تنباکو فاکتور مهمی در سقط جنین در بین زنان سیگاری باردار و زنان باردار در معرض دود سیگار است، و همچنین در بسیاری از تهدیدات دیگر برای سلامت جنین هم نقش دارد.

مونوکسیدکربن ناشی از دود سیگار می‌تواند موجب شود نوزاد در حال رشد به اکسیژن کافی دسترسی نداشته باشد.

حال مطالعه جدید نشان می‌دهد درحالی‌که قرارگیری در معرض دود سیگار در طول بارداری می‌تواند موجب نقایص تولد شود، تاثیرات آن تا سال‌ها بعد از تولد هم ادامه خواهد داشت.

طبق نتایج تحقیق اخیر، قرارگیری در معرض دود سیگار می‌تواند ریسک ابتلا به آسم را هم افزایش دهد.

این مطالعه توسط محققان دانشگاه اوتاگو نیوزیلند بر روی ۳۷۶ نوزاد انجام شده است. در این مطالعه اطلاعات مربوط به سیگار کشیدن والدین در طول بارداری و در منزل در سنین ۳ و ۱۵ ماهگی جمع‌آوری و بررسی شد. داده‌های مربوط به خس خس سینه و آسم هم به صورت پرسشنامه سالانه تا سن ۶ سالگی جمع‌آوری شد.

محققان دریافتند هرچقدر میزان قرارگیری شرکت کنندگان در معرض دود سیگار در دوره بارداری بیشتر بود، ریسک خس خس سینه و آسم هم در ۱۵ ماهگی بیشتر بود. در سنین بالاتر این ارتباط چشمگیر نبود.