

خبری خوش برای بیماران دیابتی

رئیس انجمن نوروپورولوژی ایران از روش جدیدی برای کاهش مشکلات اورولوژی در بیماران دیابتی خبر داد و گفت: این روش افقی جدید بوده و امیدواری را در زندگی بیماران مبتلا به دیابت ایجاد می‌کند.



رئیس انجمن نوروپورولوژی ایران از روش جدیدی برای کاهش مشکلات اورولوژی در بیماران دیابتی خبر داد و گفت: این روش افقی جدید بوده و امیدواری را در زندگی بیماران مبتلا به دیابت ایجاد می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، مهری مهرداد در ارتباط با روش جدید درمان عوارض دیابت اظهار داشت: دیابت بیماری است که بر روی سیستم عصبی، عروقی و غدد درون ریز تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: بیمار دیابتی تنها قند خونش بالا نیست بلکه عصب‌ها و عروق محیطی آنها نیز تحت تأثیر دیابت قرار می‌گیرد؛ لذا فرد دچار نوروپاتی می‌شود که این مسئله یک مشکل شایع در بیماران دیابتی به شمار می‌رود.

رئیس انجمن نوروپورولوژی ایران با اشاره به اینکه بیماران دچار نوروپاتی، عصب اندام انتهایی آنها دچار مشکل شده لذا حس کمتری در این ناحیه از بدن دارند.

مهرداد گفت: دیابت عوارض اورولوژی، مشکلات چشمی و فشارخون بالا به همراه دارد که شایع‌ترین مشکلات اورولوژیک: نارسایی کلیه، مشکلات جنسی، عفونت‌های ادراری و بی اختیاری ادرار و عدم تخلیه کامل ادرار است.

مهرداد بیان داشت: بیماران دچار دیابت باید دفع پروتئین 24 ساعته خود را توسط پزشک نفرولوژی چک کنند تا از نارسایی کلیه و تشدید این بیماری در آنها پیشگیری شود.

وی در مورد مشکلات جنسی بیماران مبتلا به دیابت گفت: این افراد روند نرمال جنسی ندارند و توانایی جنسی این افراد بسیار کاهش می‌یابد به طوری که یک جوان 35 ساله مبتلا به دیابت که تشکیل زندگی مشترک داده ممکن است به دلیل بیماری‌اش وضعیت جنسی مناسبی برای شروع زندگی نداشته باشد که داروها نیز نمی‌توانند چندان در رفع مشکل آن موثر واقع شوند چرا که مشکل فرد عروقی بوده و مرتبط با عصب محیطی است.

رئیس انجمن نوروپورولوژی ایران با بیان اینکه اخیراً روش جدیدی برای کمک به این بیماران ایجاد شده است، گفت: می‌توان با استفاده از روش P‐shot که نوعی روش prp است، خون فرد را با سرنگ گرفته و هورمون‌های رشد به آن اضافه و سپس به خود فرد تزریق کنیم تا سلول‌های ناحیه جنسی دوباره بتوانند عروق آن سلول سازی کنند.

مهرداد به مشکل بی اختیاری ادرار و عفونت ادراری در بیماران دیابتی اشاره کرد و گفت: فرد مبتلا به دیابت مثانه نرمالی ندارد و می‌توان گفت متأسفانه مثانه آن‌ها فلج است بنابراین هنگامی که مثانه بیمار پر شود تخلیه کامل ادرار انجام نمی‌گیرد و این مسئله عفونت ادراری و بی اختیاری‌های ادراری را برای فرد به همراه دارد چرا که فرد دچار نوروپاتی مثانه بوده و توانایی تخلیه کامل آن را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: درمان جدید مشکلات جنسی مرتبط با دیابت برای اولین بار از مرکز دیابت تهران آغاز شد و می‌توان گفت این روش افقی جدید و امیدواری را در زندگی بیماران مبتلا به دیابت باز می‌کند.