

کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد با آسپیرین

محققان بیمارستان عمومی ماساچوست متوجه شده‌اند که مصرف روزانه آسپیرین می‌تواند خطر ابتلا به سرطان کبد را کاهش دهد.



محققان بیمارستان عمومی ماساچوست متوجه شده‌اند که مصرف روزانه آسپیرین می‌تواند خطر ابتلا به سرطان کبد را کاهش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خیرآنلاین، در مقاله ارائه‌شده در *JAMA* Onvology و به گفته دکتر تریسی سیمون از بخش گوارش بیمارستان در بوستون آمده است: مصرف روزانه آسپیرین (دو دوز 325 میلی‌گرم قرص در هفته به مدت 5 سال) مانع از توسعه نوع شایع سرطان کبد به نام HCC می‌شود.

اطلاعات به‌دست‌آمده از 170 هزار نفر در طول سه دهه گذشته این امر را ثابت می‌کند که مصرف 5 ساله می‌تواند منجر به کاهش 59 درصدی ابتلا به سرطان کبد شود.

هرچند سرطان کبد شایع نبوده اما در دهه‌های اخیر میزان ابتلا به آن افزایش پیدا کرده است و کسانی که هیپاتیت ب و سی دارند، مستعد گرفتن سرطان کبد هستند.

احساس وجود یک توده زیر قفسه سینه سمت راست، احساس درد در این ناحیه، تورم شکمی، درد در سمت راست شانه که به پشت می‌زند، رنگ‌پریدگی و کبودی و خونریزی، از دست دادن وزن، تهوع، از دست دادن اشتها و ضعف غیرمعمول، از علائم ابتلا به این نوع سرطان می‌تواند باشد که تشخیص نهایی را پزشک با آزمایشات مخصوص خواهد داد.