

پیش‌بینی زمان مرگ با حس بویایی

کاهش حس بویایی می‌تواند نشانه‌ای از پیش‌بینی زمان مرگ باشد.



کاهش حس بویایی می‌تواند نشانه‌ای از پیش‌بینی زمان مرگ باشد.

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir)؛ متخصصان آمریکایی در بررسی‌های جدید دریافته‌اند افراد میان‌سالی که حس بویایی خود را تا حدودی از دست می‌دهند نسبت به افرادی که از حس بویایی قوی برخوردارند بیشتر احتمال دارد در مدت ۱۰ سال از زمان تشخیص "کاهش حس بویایی" فوت کنند.

در آزمایشات جدید مشاهده شد افراد میانسال با حس بویایی ضعیف در مقایسه با افرادی که در تست‌های تشخیصی حس بویایی شرایط بهتری داشتند ۴۶ درصد بیشتر احتمال دارد در مدت ۱۰ سال پس از انجام این آزمایش‌ها فوت کنند.

در این گزارش آمده است: ۲۸ درصد از موارد افزایش خطر مرگ و میر می‌تواند به بیماری‌های پارکینسون، زوال عقل و کاهش وزن بی‌دلیل نسبت داده شود که تمامی آن‌ها در پیش‌بینی زمان مرگ تاثیر دارند و می‌توانند بر حس بویایی فرد اثر داشته باشند.

همچنین ۷۲ درصد از موارد افزایش خطر مرگ که با کاهش حس بویایی و مرگ مرتبط است ناشناخته بوده و می‌تواند از مشکلات جسمی ناشی شود که با گذر زمان تشدید می‌شوند.

متخصصان در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ به مطالعه روی ۳۰۰۰ فرد میانسال ۷۰ تا ۷۹ ساله پرداختند. ۲۳۰۰ نفر از این افراد در شروع مطالعه تست بویایی را انجام دادند. به گفته محققان در دوره زمانی ۱۳ ساله، حدود ۱۲۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان فوت کردند.

به گزارش لایوساینس، متخصصان دریافته‌اند افرادی که در تست تشخیص بویایی عملکرد ضعیفی داشتند احتمال مرگ آنان در مدت زمان ۱۰ سال حدود ۴۶ درصد بیشتر بوده است. /باشگاه خبرنگاران