



عوارض مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها کمتر از مقدار تجویزی پزشک

سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو گفت: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک به معنی استفاده از آنتی‌بیوتیک مناسب تجویز شده با دوز مناسب و سر ساعت تعیین شده است.

سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو گفت: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک به معنی استفاده از آنتی‌بیوتیک مناسب تجویز شده با دوز مناسب و سر ساعت تعیین شده است.

دکتر الناز ذوقی در گفتگو با ایسنا، بر اهمیت رعایت دوز و فواصل زمانی تجویز شده توسط پزشک برای هر آنتی‌بیوتیک تأکید کرد و گفت: این عمل یکی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از بروز مقاومت میکروبی است. مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک به معنای مصرف آنتی‌بیوتیک مناسب بر اساس عفونت و وضعیت بالینی فرد، با دوز مناسب و در فواصل زمانی مناسب است. وی گفت: لازم است برای اثربخشی و ریشه‌کنی کامل عفونت، آنتی‌بیوتیک به غلظت مناسب در خون بیمار وجود داشته باشد و بنابراین مصرف باید به طور دقیق طبق مقدار و فواصل زمانی تجویز شده توسط پزشک و تأکید شده توسط داروساز انجام شود.

ذوقی تأکید کرد: مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها کمتر از مقدار تجویز شده یا مصرف نامنظم این داروها باعث می‌شود نه تنها عفونت بیمار درمان نشود، بلکه میکروارگانیسم‌های مقاوم به درمان نیز ایجاد شوند. میکروارگانیسم با مواجهه با آنتی‌بیوتیک کمتر از دوز موثر، نسبت به آن مکانیسم مقاومت فراهم می‌شود و با ادامه این روند به جایی می‌رسیم که برای برخی از میکروارگانیسم‌ها هیچ آنتی‌بیوتیک موثری وجود نداشته باشد. ذوقی در پایان، بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک را راهکاری اساسی برای حل بحران مقاومت میکروبی عنوان کرد.