



کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در جهان

بر اساس مطالعه‌ای که در تاریخ ۱۰ سپتامبر (ماه جاری میلادی) به صورت آنلاین در مجله «لنست» منتشر شد، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر (NCD) در اکثر کشورهای جهان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

بر اساس مطالعه ای که در تاریخ ۱۰ سپتامبر (ماه جاری میلادی) به صورت آنلاین در مجله «لنست» منتشر شد، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر (NCD) در اکثر کشورهای جهان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، دکتر «جیمز ای. بنت» از متخصصان کالج امپریال لندن و همکارانش با استفاده از داده‌های مربوط به مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و علت اصلی مرگ در ۱۸۵ کشور و منطقه، چگونگی تغییر الگوی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بررسی کردند. این متخصصان دریافتند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های غیرواگیر از بدو تولد تا سن ۸۰ سالگی در ۸۲ درصد از ۱۸۵ کشور برای زنان و در ۷۹ درصد از این کشورها برای مردان کاهش یافته است؛ این احتمال برای زنان و مردان در ۱۸ درصد و ۲۱ درصد باقی مانده کشورها به ترتیب افزایش یافته است. کشورهایی که مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در آنها برای زنان و مردان کاهش یافته است، به ترتیب ۷۲ درصد و ۷۳ درصد از جمعیت زنان و مردان جهان را در سال ۲۰۱۹ تشکیل می‌دادند. در تمام کشورهای غربی با درآمد بالا، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر کاهش یافته است که بیشترین کاهش برای هر دو جنس در دانمارک و کمترین کاهش در ایالات متحده مشاهده شده است. همچنین در بیشتر کشورها، بیماری‌های قلبی عروقی بیشترین سهم را در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ داشته‌اند، در حالی که بیماری‌های عصبی-روانی و سرطان‌های پانکراس و کبد در افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر نقش داشته‌اند. هرچند به رغم کاهش نرخ مرگ‌ومیر، برای هر دو جنس در بیشتر کشورهای غربی با درآمد بالا، همچنین در اغلب کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و در شرق و جنوب شرق آسیا و نیز برای زنان در جنوب آسیا، تغییرات سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نسبت به دهه پیش از آن، نشان‌دهنده وخامت در روند یا ابعاد ابتلا به این بیماری‌ها بوده است. به گزارش نشریه تخصصی «مدیکال اکسپرس»، نویسندگان این مطالعه می‌گویند: نتایج ما نشان می‌دهد که کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در جمعیت‌های ملی حتی در کشورهایی با مرگ و میر اولیه پایین، امکان‌پذیر است.