



## احتمال تشخیص سرطان پیشرفته در مردان بیشتر است

مردان نسبت به زنان، بیشتر بر اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند و یک مطالعه جدید یکی از دلایل احتمالی آن را نشان می‌دهد.

مردان نسبت به زنان، بیشتر بر اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند و یک مطالعه جدید یکی از دلایل احتمالی آن را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که مردان بیشتر از زنان در معرض ابتلا به سرطان پیشرفته ای هستند که به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است.

محققان گفتند که این بدان معناست که سرطان آنها خیلی دیر تشخیص داده می‌شود، زمانی که درمان آن دشوارتر و احتمال مرگ آن بیشتر است.

«بث مک لین»، محقق ارشد و دانشجوی فوق دکترا در موسسه ملی سرطان در بتسدا مرلند، در یک بیانیه خبری گفت: «ما می‌دانیم که به طور کلی، مردان بیشتر از زنان در اثر انواع مختلف سرطان جان خود را از دست می‌دهند. همچنین می‌دانیم که مرحله سرطان در زمان تشخیص، پیش بینی کننده کلیدی بقای سرطان است.»

برای این مطالعه، محققان ۲۰۴ میلیون مورد سرطان را که بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ ردیابی شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم سرطان هایی را که منطقه ای (به غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته) یا دور (به سایر اندام ها گسترش یافته بودند) بودند، در مقایسه با سرطان های موضعی که فراتر از محل مبدا خود گسترش نیافته بودند، بررسی کردند.

احتمال تشخیص ۱۶ سرطان منطقه ای مختلف در مردان بیشتر از زنان بود، از جمله:

- سرطان زبان (۱۵۱ درصد احتمال بیشتر)

- سرطان غدد بزاقی (۹۳ درصد)

- سرطان دهان و گلو (۸۰ درصد)

- سرطان تیروئید (۷۴ درصد)

- سرطان معده (۶۷ درصد)

همچنین احتمال تشخیص ۱۷ سرطان مختلف در مراحل پیشرفته در مردان بیشتر بود، از جمله:

- سرطان زبان (۱۳۴ درصد)

- سرطان تیروئید (۱۲۸ درصد)

- سرطان غدد بزاقی (۹۷ درصد)

- سرطان معده (۵۶ درصد)

- ملانوما (۵۰ درصد)

فقط در تعداد کمی از سرطان ها، احتمال تشخیص سرطان در مراحل بعدی در مردان کمتر از زنان بود، از جمله سرطان حنجره،

مک لین گفت: «توضیحات احتمالی متنوعی برای اینکه چرا ما تفاوت های جنسیتی را در بین اکثر سرطان هایی که مورد مطالعه قرار دادیم، یافتیم، وجود دارد. یک توضیح می تواند تفاوت در جذب غربالگری سرطان برای مکان هایی باشد که از طریق غربالگری قابل تشخیص هستند.»

او گفت: «همچنین ممکن است تفاوت هایی در رفتارهای جستجوی مراقبت های بهداشتی وجود داشته باشد؛ تحقیقات موجود نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان به پزشک مراجعه می کنند، که می تواند به معنای فرصت های بیشتر برای پزشکان برای تشخیص زودهنگام علائم سرطان باشد، در نتیجه زنان بیشتری به جای مراحل منطقه ای یا دوردست، در مرحله موضعی تشخیص داده می شوند.»

مک لین افزود: «همچنین این احتمال وجود دارد که نحوه درک پزشکان از علائم سرطان در مردان و زنان متفاوت باشد و منجر به انواع مختلف آزمایش های تشخیصی یا برنامه های درمانی شود که می تواند تشخیص سرطان را تسریع یا به تأخیر بیندازد.»

او گفت: «در هر صورت، دریافت مراقبت های پزشکی منظم برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه و قابل درمان بسیار مهم است.»

مک لین توصیه می کند: «پیام کلی من این است که همه باید مرتباً به پزشک مراجعه کنند. اگر متوجه شدید چیزی در بدن شما تغییر کرده است، مراجعه به پزشک را به تعویق نیندازید.»