



مادران شیرده از مصرف مسکن ها خودداری کنند

پژوهشگران به مادران شیرده هشدار می دهند مصرف داروهای مسکن حاوی کدئین را به دلیل مضرات آن برای نوزاد محدود کنند.

پژوهشگران به مادران شیرده هشدار می دهند مصرف داروهای مسکن حاوی کدئین را به دلیل مضرات آن برای نوزاد محدود کنند.

به گزارش شینهوا، دکتر گاوین پاتولو پزشک متخصص بیهوشی بیمارستان رویال نوت شور سیدنی گفت: زنانی که به تازگی مادر شده اند باید مصرف داروهای مسکن حاوی کدئین را به کمتر از چهار روز کاهش دهند. به گفته وی این مادران اگر به دلیل مصرف این دارو احساس خواب آلودگی می کنند مصرف دارو را متوقف می کنند و نوزاد خود را برای بررسی علائم خواب آلودگی نزد پزشک متخصص ببرند. به گفته پاتولو این امر به این خاطر است که کدئین باید برای تولید مورفین در کبد سوخت و ساز شود تا درد را از بین ببرد و این فرایند تبدیل در کبد بسیار غیرقابل پیش بینی است. وی افزود: کبد برخی از بیماران پس از مصرف کدئین میزان زیادی مورفین تولید می کند و موجب خواب آلودگی می شود درحالی که ممکن است دیگران اصلا مورفینی تولید نکنند. پاتولو می گوید: برای مادران شیرده، میزان زیاد مورفین می تواند از طریق شیر وارد بدن نوزاد شده و موجب مرگ نوزاد بر اثر مصرف زیاد مورفین شود. در حالی که تازه مادران نباید نگران باشند اما باید بدانند مسکن های حاوی کدئین در موقعیت خاصی می تواند مضر باشند.