

روشی امیدبخش برای درمان آسم



پزشکان ادعا کردند که در مطالعات اخیر خود یک روش درمانی جدید و بالقوه برای به تاخیرانداختن حملات آسم پیدا کرده‌اند. این حملات معمولاً چند ساعت بعد از تماس با مواد آلرژیک بروز می‌کنند.

جام جم آنلاین: پزشکان ادعا کردند که در مطالعات اخیر خود یک روش درمانی جدید و بالقوه برای به تاخیرانداختن حملات آسم پیدا کرده‌اند. این حملات معمولاً چند ساعت بعد از تماس با مواد آلرژیک بروز می‌کنند. به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان علوم پزشکی کالج سلطنتی لندن طی آزمایشات دقیق دریافتند متوقف کردن فعالیت‌های عصبی حسی موجب توقف «واکنش آسمی جدید» می‌شود.

به گفته متخصصان؛ واکنش آسمی جدید به این خاطر بروز می‌کند که ماده آلرژیک از اعصاب حسی را در مجاری تنفسی به کار می‌اندازند. این اعصاب سپس موجب بروز مجموعه‌ای از واکنش‌ها می‌شوند که حاصل آن آزاد شدن انتقال دهنده عصبی استیل کولین است که موجب باریک شدن مجاری تنفسی می‌شود.

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، این آزمایشات فعلاً روی موش‌ها صورت گرفته و اگر در مورد انسانها نیز صدق کند بدین معنی است که می‌توان در آینده با تولید داروهای جدید آزادسازی استیل کولین را متوقف کرد و در نهایت از بروز حملات آسم تاخیری در بیماران پیشگیری کرد.