

تومور روده درمان قطعي مي شود

فوق تخصص کلورکتال (روده بزرگ) گفت: درمان تومورهاي کلون و روده بزرگ در مراحل اوليه تشخيص يعني در درجه يك و دو به طور قطعي درمان مي شوند و فرد مي تواند زندگي عادي خود را داشته باشد



جام جم آنلاين: فوق تخصص کلورکتال (روده بزرگ) گفت: درمان تومورهاي کلون و روده بزرگ در مراحل اوليه تشخيص يعني در درجه يك و دو به طور قطعي درمان مي شوند و فرد مي تواند زندگي عادي خود را داشته باشد. دکتر مریم محسني روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمي ایرنا افزود: افرادي که به موقع يعني زماني که جداره روده درگیر نشده باشد به پزشک مراجعه کنند بدون شک مي توانند از نصب استومي (کیسه روي شکم) فرار کنند.

استومي در واقع همان کیسه اي است که براي دفع مزاج فرد انتهاي روده بزرگ و روي شکم فرد بیمار قرار مي گیرد و به فردي که استومي دارد استوميت گفته مي شود.

عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اظهارداشت: از طرف دیگر يعني زماني که استیج بیماری بالا باشد و غدد لنفاوي يا جاهاي دیگر شکم درگیر شده باشد دراین صورت دیگر بیمار از دست پزشک خارج مي شود که دراین زمان فقط مي توانيم زمان باقیمانده زندگي فرد را کیفیت بهتري ببخشيم.

وي با بیان اینکه بیماری هايي مانند کلون روده ، سرطان و به طورکلي بیماری هاي التهابي روده باعث نصب استومي روي جداره شکم مي شود گفت: سرطان در روده بزرگ ممکن است با علائمي همچون کاهش وزن ، تغییر اجابت مزاج که افراد باید به آن توجه ویژه اي داشته باشد ، تغییر قطر مدفوع يا کم خوني همراه باشد که فرد به محض مشاهده این علائم باید به پزشک مراجعه کند.

به گفته وي مشکلات واضح تر این بیماری ها خونريزي دستگاه گوارش است و تهوع جزو علائم دير رس است يعني در این حالت دیگر تومور پیشرفت کرده است.

این پزشک متخصص ادامه داد: سن ابتلا به بیماری هاي دستگاه گوارش بالای 50 سال است اما بهتر است افرادی که سابقه خانوای این نوع بیماری ها را دارند تحت نظر پزشک باشند و به طور مداوم تحت کنترل قرار گیرند.

وي تاکید کرد: انجام معاینات مداوم وتخصصي دستگاه گوارش براي تمام کشورها هزینه بالايي دارد بنابراین براي کشور ما نیز همینطور است اما این دلیل نمي شود که این معاینات انجام نشود چون عواقبش جبران ناپذیر خواهد بود.

محسني با اشاره به پیشرفت علم پزشکی در این زمینه گفت: حدود 10 تا 15 سال است که این امکان ایجاد شده افرادی که در زمان مناسب و اوليه بیماری مراجعه کنند دیگر نیازی به نصب استومي يا کیسه روي جداره شکم نداشته باشند به این صورت که قسمتي از روده کوچک را به شکل محفظه اي در مي آورند و آنرا به ناحیه مقعد متصل مي کنند ؛ به عبارتي از روده کوچک براي کارکرد روده بزرگ استفاده مي کنند.

وي ادامه داد: چون جذب دیواره روده کوچک نسبت به روده بزرگ کمتر است از این رو از دو یا سه قسمت روده کوچک براي ایجاد يك محوطه به جاي روده بزرگ استفاده مي کنند که دراین صورت دیگر نیازی به نصب کیسه روي جداره شکم نیست که به آن 'پوچ' مي گویند.

محسني با بیان اینکه امکان چنین عمل جراحی در ایران وجود دارد گفت: این جراحی نه تنها به روش باز بلکه به روش لاپاراسکوپي نیز انجام مي شود ، وي تاکید کرد: تمام این مراحل موفق درمان فقط در صورتی است که فرد به موقع به پزشک مراجعه کند.