

کاهش حس لامسه هشدار ابتلا به اماس

نایب رئیس انجمن اماس گفت: تاري دید يکي از علائمي است که فرد با احساس آن باید مشکوک به ابتلا به اماس شود به گونه‌اي که به مدت دست کم 24 ساعت حس کند که از پشت شیشه کدر به محیط نگاه می‌کند.



جام جم آنلاین: نایب رئیس انجمن اماس گفت: تاري دید يکي از علائمي است که فرد با احساس آن باید مشکوک به ابتلا به اماس شود به گونه‌اي که به مدت دست کم 24 ساعت حس کند که از پشت شیشه کدر به محیط نگاه می‌کند. دکتر محمدعلي صحراييان به ايسنا گفت: به احساس دیدن اشيا از پشت شیشه کدر، التهاب عصب چشمي می‌گویند و فرد مبتلا به آن باید به پزشک مراجعه کند.

در کل علائم حسي شایع‌تر از علايم بينايي اماس است. سوزن سوزن شدن اندام‌ها و همزمان با آن کاهش حس لامسه از جمله اختلالات حسي ناشي از ابتلا به اماس است.

وي درباره شایع‌ترین نوع اماس گفت: شایع‌ترین نوع اماس در ایران و جهان نوع عود کننده و بهبود يابنده است به گونه‌اي که تقریبا 85 درصد مبتلایان به این بیماری در ایران در شروع بیماری خود این نوع اماس را تجربه می‌کنند و تعدادي از بیماران ممکن است پس از سال‌ها به نوع پیشرونده ثانویه دچار شوند.

نایب رئیس انجمن اماس افزود: این بیماری در حدود 10 درصد از بیماران با نوع پیشرونده اولیه آغاز می‌شود. شایع‌ترین علائم این بیماری حسي و بينايي است.

صحراييان در توضیح انواع بیماری اماس گفت: نوع عود کننده و بهبود يابنده، نوعي از اماس است که بیماری فرد با حملاتي به صورت تشدید علايم عصبي مانند تاري دید و اختلال در دید یا اختلال حرکتی شروع می‌شود. در نوع پیشرونده ثانویه، بیمار هیچ حمله‌اي را تجربه نمی‌کند اما بیماری او به آرامي پیشرفت می‌کند. در نوع پیشرونده اولیه بیماری از ابتدا با پیشرفت علائمي مانند ضعف اندام‌ها آغاز می‌شود.