

3 نفر در تبریز قربانی قاتل نامرئی شدند

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سه نفر عضو یک خانواده در تبریز بر اثر مسمومیت مونواکسید کربن و گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.



مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سه نفر عضو یک خانواده در تبریز بر اثر مسمومیت مونواکسید کربن و گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

حبیب حسینی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: روز گذشته ساعت 17.30 دقیقه در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر جان باختن اعضای یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن آمبولانس‌های مرکز فوریت‌های پزشکی مناطق چهار و 12 تبریز به محل حادثه اعزام شده و با جسد سه نفر در خانه مواجه شدند.

وی افزود: پیش از رسیدن مرکز فوریت‌های پزشکی متأسفانه یک خانم و آقا حدود 30 ساله و پسر بچه شش ساله ساکن این منزل بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست داده بودند.

وی ادامه داد: این اتفاق از طریق نشت گاز از طریق آبگرمکن صورت گرفته به طوری که این حادثه را همسایگان به مرکز فوریت‌های پزشکی خبر دادند.

حسینی‌زاده ادامه داد: با توجه به نشت آب از طریق طبقه بالا به طبقه پایین همسایگان هر چه درمی‌زنند کسی در را باز نمی‌کند بالاخره بعد متوجه می‌شوند اعضای خانواده طبقه بالا در اثر استنشاق مونواکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه در منطقه نصف‌راه، کوی اشکان اتفاق افتاده است.

وی تأکید کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز موجب این حوادث شده که وزش شدید باد در تبریز در روزهای گذشته نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب مسمومیت شده است.

حسینی‌زاده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی اضافه کرد: عدم استفاده از دودکش‌های استاندارد و نیز استفاده چند وسیله گازسوز از یک دودکش از جمله عللی هستند که موجب برگشت گاز منوکسیدکربن به داخل خانه و مسمومیت با این گاز خطرناک می‌شود.

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی تبریز گفت: سرگیجه، تهوع، سردرد و احساس خواب‌آلودگی از جمله علائم گازگرفتگی هستند.

وی گفت: فردی که دچار این حالت‌ها شده باید از محل خارج شده و در صورتی که علائم رفع نشد فوراً به مراکز اورژانس منتقل شود.

حسینی‌زاده، مسمومیت به گاز منوکسیدکربن در میان اطفال و نوزادان را خطرناک دانست و گفت: در این کودکان علائمی مانند خواب‌آلودگی، تهوع و علائم مسمومیت دیده می‌شود و این دسته از کودکان کمتر گریه می‌کنند.

وی افزود: مشاهده علائمی مانند کبودی در دست و نقاط مختلف این دسته از کودکان نیز دیده می‌شود که احتمال خونریزی داخلی در آنان وجود دارد.