

ارتباط چاقی مادر و اوتیسم کودک

یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که اضافه وزن مادر می‌تواند عاملی در ابتلا کودک به بیماری اوتیسم باشد.



جام جم آنلاین: یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که اضافه وزن مادر می‌تواند عاملی در ابتلا کودک به بیماری اوتیسم باشد. به گزارش روز چهارشنبه جام جم آنلاین به نقل آسوشیتدپرس، تحقیق دانشمندان آمریکایی به روی بیش از 1000 کودک دو تا پنج ساله که سالم یا دچار بیماری اوتیسم بودند نشان داد مادرانی که پیش از بارداری اضافه وزن داشته باشند خطر تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم را افزایش می‌دهند.

دانشمندان تاکید کردند به طور کلی فشار خون، دیابت و اختلال در متابولیسم که از ناشی از چاقی هستند در یک مادر باردار موجب افزایش احتمال تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم می‌شوند.

این در حالی است که تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم در نزد مادرانی که هنگام بارداری وزن عادی داشته یا لاغر باشند، به مراتب کمتر از مادران چاق است.

در آمریکا موارد اوتیسم کودکان بیش از پیش رو به افزایش است به طوریکه از هر هشت کودک آمریکایی یک کودک به نوعی از اوتیسم رنج می‌برد.

افزایش جمعیت چاق در آمریکای شمالی دانشمندانی که این تحقیق را انجام داده اند، نگران کرده است. براساس آماری که اخیراً منتشر شده حدود یک زن از هر سه زن آمریکایی که در سنین بارداری هستند، چاق بوده و اضافه وزن دارند. مترجم: بهرام افتخاری