

گیاهانی که خطر مرگ دارند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: مسمومیت با گیاهان تزئینی و آپارتمانی می‌تواند کشنده باشد.



سلامت نیوز: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: مسمومیت با گیاهان تزئینی و آپارتمانی می‌تواند کشنده باشد.

دکتر بهرام دلفان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه مسمومیت با گیاهان یکی از شایع‌ترین علل بروز مسمومیت‌های اتفاقی در کودکان به شمار می‌رود، افزود: مصرف یک گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی دلیلی بر غیررسمی بودن آن برای انسان نیست.

این متخصص داروسازی با تأکید بر اینکه برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمان‌ها و باغچه‌ها می‌توانند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند، یادآور شد: در صورت بلعیدن قسمت‌های مختلف یک گیاه مانند میوه، دانه و برگ توسط کودکان، فوراً با مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم تماس بگیرید.

این مدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خاطرنشان کرد: مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، گل انگشتانه، آزالیا، شوکران و کرچک می‌تواند کشنده باشد و در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان بیمار را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه مسمومیت با قارچ‌های سمی یکی از عوامل کشنده محسوب می‌شود، اظهار کرد: از مصرف قارچ‌هایی که نوع آنها را نمی‌شناسید جداً خودداری کنید.

وی گفت: برخی از قارچ‌های سمی در صورت مصرف خوراکی می‌توانند باعث نارسایی حاد کبدی و حتی مرگ شوند.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: تشخیص قارچ‌های سمی از انواع غیرسمی از روی شکل ظاهری آنها کاری دشوار بوده و نیاز به تجربه و تبحر دارد.

دکتر دلفان با توصیه به خانواده‌ها، ادامه داد: از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوه‌ها و ظاهر جذاب برای کودکان هستند، خودداری کنند.

وی با تأکید بر اینکه کنجکاوای کودکان زیر پنج سال و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش‌های مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده شدن آن توسط کودک می‌شود، متذکر شد: شیریه سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دیفن باخیا و کالادیوم در صورت خورده شدن می‌تواند سبب خارش، تورم و سوزش مخاط دهان و خفگی و یا آسیب گوارشی فرد مسموم شود.

دلفان اضافه کرد: برخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا نابجا می‌توانند مسمومیت‌های منجر به مرگ ایجاد کنند.

وی اظهار کرد: بخور اکالیپتوس در صورتی که به اشتباه خورده شود حتی در مقادیر کم (یک قاشق) می‌تواند کشنده باشد و اطرافیان باید از القای استفراغ در مسمومیت با این فرآورده‌ها خودداری و مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنند.