



دیابت موجب ناشنوایی می‌شود

محققان ژاپنی با اشاره به اینکه دیابت فقط موجب نابینایی و قطع عضو نمی شود هشدار دادند که این بیماری یکی از عوامل بروز ناشنوایی نیز هست.

محققان ژاپنی با اشاره به اینکه دیابت فقط موجب نابینایی و قطع عضو نمی شود هشدار دادند که این بیماری یکی از عوامل بروز ناشنوایی نیز هست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان دریافته اند بیماران مبتلا به دیابت بیش از آنهایی که دیابت ندارند به مشکلات شنوایی مبتلا می شوند.

این محققان خاطرنشان کردند تاثیر دیابت در بروز ناشنوایی مستقل از سن و محیط پر سر و صدا انجام شده است.

تعداد افراد مبتلا به مشکلات شنوایی از 1995 تا 2004 دو برابر شده است.

دکتر چیکا هوریکاوا مجری این تحقیقات گفت: ارتباط بین ناشنوایی با دیابت بحث انگیز است اما اعتقاد بر این است که در طول زمان گلوکز بالای خون می تواند به عروق ناحیه stria vascularis گوش آسیب زده و توانایی شنیدن را کاهش دهد.

وی افزود: در بررسی هایمان دیدیم افراد مبتلا به دیابت دو برابر بیشتر از آنهایی که دیابت نداشتند دچار ناشنوایی شده بودند.