



واکنش مغز افراد افسرده نسبت به درد متفاوت است

نتایج یک تحقیق تازه حاکیست؛ مغز افراد افسرده به شیوه‌ای متفاوت، درد را کنترل می‌کند...

نتایج یک تحقیق تازه حاکیست؛ مغز افراد افسرده به شیوه‌ای متفاوت، درد را کنترل می‌کند. به گزارش سلامت نیوز، دانشمندان به سر نخ‌هایی در مغز بیماران افسرده دست یافته‌اند که توجیه می‌کند چرا بسیاری از بیماران افسرده با دردهای مزمن دست به گریبان هستند. تصویربرداری از مغز بیماران نشان داد که فعالیت مناطقی از مغز که با احساسات در ارتباط هستند در افراد افسرده به هنگام تجربه درد و اضطراب، بیشتر از فعالیت مغز انسان‌های سالم است. این بررسی از سوی پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو روی 15 فرد حدود 20 ساله و مبتلا به افسردگی حاد صورت گرفته است. سپس تصاویر مغزی این افراد با 15 فرد مشابه اما بدون علائم افسردگی مقایسه شد. مقایسه‌ها نشان داد؛ فعالیت مغز در بیماران افسرده به هنگام تجربه درد بیشتر از افراد سالم است. محققان می‌گویند؛ این یافته جدید می‌تواند به کشف راه‌های جدید درمان افسردگی حاد چه از طریق رفتار درمانی و چه از طریق دارو درمانی منجر شود.