



یافته های جدید از تاثیر چاقی و خطر بروز بیماری های لته

یافته های جدید نشان می دهد که چاقی و اضافه وزن خطر ابتلا به بیماری های لته را افزایش می دهد.

یافته های جدید نشان می دهد که چاقی و اضافه وزن خطر ابتلا به بیماری های لته را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از محققان با انجام مطالعات خود دریافتند چاقی علاوه بر آن که یک عامل خطر برای توسعه دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و انواع سرطان ها محسوب می شود می تواند باعث وقوع بیماری های لته نیز شود.

براساس یافته محققان بدن افراد چاق به طور بی وقفه پروتئین هایی با خواص التهابی به نام سایتوکاین ها را تولید می کند که آنها به طور مستقیم می توانند باعث آسیب بافت لته یا کاهش جریان خون به بافت لته شده و باعث ترویج بیماری های لته شوند.

یافته های این گزارش نشان می دهد که نیمی از جمعیت 30 ساله و مسن تر در آمریکا تحت تأثیر بیماری لته (عفونت و التهاب مزمنی است که در اطراف لته و بافت نگهدارنده اطراف دندان رخ می دهد) قرار می گیرند که بیماری لته به خودی خود نیز باعث افزایش مجموعه ای از سایتوکاین های خاص خودش می شود و سطح این پروتئین ها در جریان خون به تنظیم یک واکنش زنجیره ای سایر بیماری های التهابی در سراسر بدن کمک می کند.

به گفته محققان تحقیق در مورد ارتباط چاقی و وقوع بیماری های لته هنوز هم ادامه دارد که در این میان چیزی که مهم است مراجعه به دندانپزشک به صورت حداقل 2 بار در سال است که این موضوع ضمن پیشنهاد استراتژی های پیشگیرانه می تواند خطر ابتلا به بیماری های لته را ارزیابی کند.

به گزارش مهر، نتایج این تحقیق در نشریه بالینی جنرال دنتیستری منتشر شده است.