



عامل آلرژی فصلی در بهار کجاست؟

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی گفت: افراد مستعد به آلرژی، در صبح اول وقت و غروب کمتر در محیط باز تردد کنند چرا که تراکم گرده گیاهان در این مواقع بیشتر است.

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی تشریح کرد

عامل آلرژی فصلی در بهار کجاست؟

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی گفت: افراد مستعد به آلرژی، در صبح اول وقت و غروب کمتر در محیط باز تردد کنند چرا که تراکم گرده گیاهان در این مواقع بیشتر است.

مریم محلوجی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: آلرژن‌ها به دو دسته آلرژن‌های محیط باز و محیط بسته تقسیم می‌شوند و آلرژی بهاری در مواجهه با آلرژن‌های محیط باز به وجود می‌آید.

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی گفت: آلرژی در واقع پرکاری سیستم ایمنی است که افراد مستعد ژنتیکی در مواجهه با عوامل آلرژی زای موجود در محیط، با افزایش راه‌های هوایی به آن پاسخ می‌دهند.

محلوجی‌راد سردسته آلرژن‌های محیط باز را گیاهان دانست و گفت: گیاهان در فصول مختلف گرده‌افشانی می‌کنند و درختان فقط در فصل بهار گرده‌افشانی می‌کنند.

محلوجی‌راد افزود: معمولاً علائم آلرژی از زمان گرده‌افشانی درختان در اسفند آغاز می‌شود و با پایان فصل بهار به اتمام می‌رسد.

این فوق تخصص آلرژی افزود: عطسه، آبریزش بینی، خارش بینی، حلق، چشم‌ها و انسداد بینی از علائم ابتلا به آلرژی است.

محلوجی‌راد به افراد مستعد به آلرژی توصیه کرد: به خاطر تراکم گرده گیاهان در صبح اول وقت و غروب در محیط باز کمتر تردد کنند.

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی مصرف آمپول‌هایی را که به عنوان آمپول حساسیت تزریق می‌شود جایز ندانست و گفت: این آمپول‌ها حاوی کورتون هستند که مصرف آن‌ها عوارض بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت و این فقط در موارد ضروری با تجویز پزشک باید انجام شود.

محلوجی‌راد استفاده از داروهای موضعی داخل بینی یا خوراکی را در کنترل علائم آلرژی مفید دانست.