

دیابت و افزایش خطر مرگ ناشی از حملات قلبی

محققان می‌گویند که بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، مبتلایان به دیابت بیشتر از دیگران در معرض خطر مرگ ناگهانی پس از حملات قلبی قرار دارند ...



همشهری آنلاین: محققان می‌گویند که بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، مبتلایان به دیابت بیشتر از دیگران در معرض خطر مرگ ناگهانی پس از حملات قلبی قرار دارند

به گزارش ایرنا، محققان علوم پزشکی دانشگاه آیوا اعلام کردند: نتایج مطالعات قلبی نشان داد که دیابت، خطر مرگ ناشی از حمله قلبی را افزایش می‌دهد، اما این مطالعه که به تازگی انجام شده است، مسیر آنزیمی این خطر را مشخص کرده است و بر این اساس می‌توان روش درمانی و پیشگیری جدیدی برای این خطر تعریف کرد.

دکتر مارک آندرسون، و همکارانش معتقدند که دیابت بیش از هشت درصد از جمعیت آمریکا را مبتلا کرده است و حملات قلبی نیز علت اصلی مرگ و میر مبتلایان به دیابت در این کشور است.

دیابت همچنین سبب افزایش مسیر اکسیداسیون استرس در سطح سلولی می‌شود.

محققان دریافته‌اند که یک مسیر آنزیمی به نام پروتئین کیناز دو مرتبط با کلسیم کالمودولین، در بیماران دیابتی، به افزایش خطر مرگ ناشی از حملات قلبی کمک می‌کند.

محققان معتقدند که با بررسی بیشتر این مطالعه می‌توان به روش درمانی جدیدی دست یافت.