



معرفی کشورهای رکورد دار سکنه مغزی مرتبط با مصرف سیگار

یک گزارش جدید حاکی از آن است که مرگ و میر ناشی از سکنه مغزی ایسکمیک (IS) بر اثر مصرف دخانیات در چین، هند و روسیه در مجموع از میزان کلی تمامی کشورهای جهان بیشتر است.

یک گزارش جدید حاکی از آن است که مرگ و میر ناشی از سکنه مغزی ایسکمیک (IS) بر اثر مصرف دخانیات در چین، هند و روسیه در مجموع از میزان کلی تمامی کشورهای جهان بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پژوهش که به سرپرستی دانشگاه آکسفورد انگلیس انجام شده است، دکتر محمدحسین فروزانفر، دکتر مجید عزتی و دکتر محسن نقوی پژوهشگران ایرانی نیز حضور داشته اند.

این تحقیق به نتایج مطالعات مرتبط با (IS) بررسی بار جهانی بیماری که در سال 2012 منتشر شده است پرداخته و همچنین تجزیه و تحلیل های بیشتری را در مورد تاثیرات مصرف دخانیات فراهم می آورد.

در این گزارش آمده است طی سالهای 1990 و 2010 سه کشور چین، هند و روسیه در صدر کشورهای قرار داشته اند که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از سکنه مغزی ایسکمیک مرتبط با سیگار را دارند.

دکتر "درک بنت" سرپرست این تحقیقات از دانشگاه آکسفورد گفت: سیاست های کنترل مصرف دخانیات که شروع مصرف سیگار و ترک آن را هدف قرار می دهد می تواند نقش مهمی را در پیشگیری سکنه مغزی ایسکمیک ایفا کند.

به گفته وی در چین، روسیه و هند حتی کمترین کاهش در تعداد سیگاری ها می تواند جان میلیون ها نفر را از خطر IS نجات دهد.

در این گزارش تمامی مرگ و میر ناشی از سکنه مغزی ایسکمیک مرتبط با مصرف سیگار در 187 کشور حاضر در مطالعه GBD 2010 بررسی شد. در این بررسی آمده است در سال 1990، چین 26 درصد، روسیه 10 درصد، هند 7 درصد، آمریکا 5 درصد و ژاپن چهار درصد این مرگ ها را به خود اختصاص داده اند.

در سال 2010 این کشورها همچنان بالاترین میزان مرگ و میر مرتبط با مصرف سیگار نه تنها حفظ کرده بلکه این میزان را افزایش داده اند به طوریکه این مرگ ها در چین 29 درصد، روسیه 12 درصد، هند 11 درصد بوده اند. این درحالی است که بقیه کشورهای جهان در مجموع 48.5 درصد از تمامی مرگ و میر IS مرتبط با سیگار را به خود اختصاص داده اند.

به گفته بنت، نکته نگران کننده این گزارش اینجاست که مرگ و میر سکنه مغزی ایسکمیک مرتبط با مصرف دخانیات در چین، روسیه و هند طی این 20 سال افزایش یافته است.

وی افزود: حتی با وجود آنکه آمریکا و ژاپن بین سالهای 1990 تا 2010 وضعیت بهتری پیدا کرده اند، هنوز با 2.6 درصد و 3.4 درصد از تمامی مرگ و میرهای سکنه مغزی ایسکمیک مرتبط با مصرف دخانیات در رتبه ششم و پنجم در سال 2010 قرار دارند.

بر اساس این بررسی تقریباً 11 میلیون و 569 هزار سکنه مغزی ایسکمیک (63 درصد) در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط و تقریباً دو میلیون 835 هزار مرگ و میر ناشی از سکنه ایسکمیک (57 درصد) در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط روی داده است.

نتایج این تحقیقات در نشریه Global Heart که نشریه فدراسیون جهانی قلب است منتشر شده.