

مزایا و مضرات داروهای ضدانعقاد خون

داروهای ضدانعقاد که برای کاهش خطر لخته‌گی خون در ریه‌ها تجویز می‌شوند در عین حال می‌توانند خطر خونریزی را نیز تشدید کنند.



داروهای ضدانعقاد که برای کاهش خطر لخته‌گی خون در ریه‌ها تجویز می‌شوند در عین حال می‌توانند خطر خونریزی را نیز تشدید کنند.

به گزارش سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این بررسی اطلاعات مربوط به تعدادی بیمار که از داروهای ضدلخته‌گی خون موسوم به داروهای «ترومبولیتیک» برای از بین رفتن لخته‌های خطرناک در ریه‌هایشان مصرف کرده بودند، بازبینی شد. نتایج بررسی‌ها تایید کرد به رغم آنکه این داروها توانسته بودند در حفظ طول عمر بیماران نقش داشته باشند اما از سوی دیگر آنان را با خطر خونریزی به خصوص در ناحیه مغز مواجه کرده بود.

دکتر «جوشوا بکمن» از بیمارستان زنان بوستون که در این مطالعه شرکت نداشت، گفت: این مطالعه درک ما را نسبت به تأثیرات این داروها بر بدن افزایش داد اما به استناد نتایج این مطالعه نمی‌توان برای تمام بیماران نظر یکسان و قطعی اعلام کرد. همچنین روش درمانی برای از بین بردن لخته‌های خون مزیت‌هایی دارد اما لازم است مطالعات بیشتری برای تعیین نوع داروی مناسب و توصیه آن به بیماران انجام شود.

دکتر «جی گیری» از دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا و متخصص ارشد این مطالعه گفت: در بررسی اخیر اطلاعات مرتبط با 2115 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد که احتمال مرگ زودرس در بین افرادی که از داروهای ضدلخته‌گی خون مصرف کرده بودند تا 47 درصد کاهش پیدا کرد، هرچند خطر خونریزی نیز در این افراد در مقایسه با گروهی که از داروهای پیشگیری از تشکیل لخته خونی مصرف کرده بودند، حدود سه برابر افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از هلت دی نیوز، با این حال این تیم تخصصی در بررسی خود دریافتند که خطر خونریزی شدید ناشی از مصرف داروهای ضدانعقاد خون در بیماران 65 ساله و جوانتر به مراتب کمتر بوده و افزایش قابل توجهی ندارد.