



خونریزی مغزی چه علائمی دارد؟

شب دهم ذیحجه از لیالی مبارک و شب هایی به شمار می رود که احیاء و شب زنده داری در آن مستحب است.

خونریزی مغزی نوعی خونریزی داخلی درون فضای جمجمه است که به دلیل پاره شدن عروق مغزی بر اثر ضربه به سر، فشارخون بالا، آنه، سم عهقه، ه دلا، دنگ، خ م، دهد. خونریزی مغزی با توجه به موقعیت خونریزی نسبت به پرده های مغزی می تواند به انواع مختلف تقسیم شود که عبارتند از اپی دورال، ساب دورال، ساب آراکنوئید، داخل مغزی. خونریزی می تواند حاد یا مزمن (مانند خونریزی ساب آراکنوئید). تشخیص قطعی اغلب با سی تی اسکن یا MRI ممکن است و در صورت تأیید، درمان فوری (در جهت کاهش فشار داخل مغزی، قطع خونریزی و رفع ادم مغزی) ضروری است.

مهمترین نشانه های ضربه مغزی

مهم ترین علائم ضربه مغزی عبارتند از: بیهوشی، استفراغ مکرر و قطع تنفس. در چنین شرایطی باز کردن راه تنفسی مصدوم در محل حادثه اهمیت زیادی دارد و با توجه به زمان به هوش آمدن، عوارض مختلفی برای فرد به وجود می آید.

سقوط از بلندی، تصادفات، اصابت اجسام سخت به جمجمه مانند سنگ یا میله آهنی از علل ایجاد ضربه مغزی هستند و در درمان فردی که دچار ضربه مغزی شده، برطرف کردن مشکل تنفسی، پایین آوردن فشار مغز و مطمئن شدن از نداشتن عفونت ثانویه ضروری است و در بعضی مواقع برای فرد صدمه دیده دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می شود. (دانشنامه علوم روانشناسی)