



ترمیم زخم با استفاده از سیستم «خلاء» / کاهش دوره درمان تا ۵۰ درصد

مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران اقدام به ترمیم زخم های مزمن با استفاده از سیستم خلاء یا وکیوم تراپی کرده است که با این روش ۳۰ تا ۵۰ درصد دوره ترمیم زخم های مزمن کاهش می یابد.

مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران اقدام به ترمیم زخم های مزمن با استفاده از سیستم خلاء یا وکیوم تراپی کرده است که با این روش ۳۰ تا ۵۰ درصد دوره ترمیم زخم های مزمن کاهش می یابد.

غلامرضا اسماعیلی جاوید، رئیس مرکزترمیم زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مرکز موفق شدیم تا علاوه بر استفاده از لارو مگس (لارو درمانی) از روش های دیگری مانند وکیوم تراپی به ترمیم زخم های دیابتی، بستر و مزمن بپردازیم.

وی افزود: در وکیوم تراپی یا دستگاه سیستم خلاء می توان بافت های مرده زخم مزمن را از بین برد، تا بدین وسیله بافت های سالم بدن فرد، به بافت های مرده تبدیل نشود.

اسماعیلی جاوید اظهار داشت: در روش وکیوم تراپی یک فشار منفی در زخم ایجاد می کنیم تا تمام ترشحات عفونی خارج شوند و این ترشحات به سمت داخل زخم برنگردند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با حمایت از شرکت های دانش بنیان و با همکاری دانشگاه اصفهان، دستگاه وکیوم تراپی به عنوان یک محصول رقابتی در کشور به تولید رسانده شد تا در این راستا بتوانیم به درمان زخم های مزمن بپردازیم.

رئیس مرکز ترمیم زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در این روش، بیمار می تواند به تمام فعالیت های روزانه خود برسد، ادامه داد: در ترمیم زخم های مزمن با وکیوم تراپی، دیگر نیازی به بستری بیمار نیست و نهایتاً زخم طی دو روز بهبود می یابد.

وی افزود: این روش در امریکا و اروپا هزینه درمانی زیادی دارد اما در این مرکز، بیماران مبتلا به زخم های مزمن با کمترین هزینه (۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) درمان می شوند.

وی با تاکید بر اینکه البته از سوی دیگر، بیمه ها می توانند این نوع درمان را تحت پوشش قرار دهند، گفت: به دلیل اینکه بیماران مبتلا به زخم های مزمن از جمله زخم دیابتی، اکثراً در طبقه متوسط و ضعیف هستند و بیمه های خوبی ندارند از این رو در صدد کاهش هزینه درمانی این بیماری نیز هستیم.

اسماعیلی جاوید افزود: اگر بیمار با هر روش استاندارد به درمان و یا ترمیم زخم دیابتی بپردازد، باید زمان زیادی صرف کند تا بهبود یابد، اما با استفاده از روش وکیوم تراپی ۳۰ تا ۵۰ درصد مدت زمان ترمیم زخم کاهش می یابد.

وی تاکید داشت: البته در برخی افراد (بیماران شریانی) نمی توانیم از وکیوم تراپی استفاده کنیم به دلیل اینکه سیستم خلاء در زخم و اندام های دیگرشان تاثیر منفی می گذارد.