



تخریب بافت ناخن، هشداري براي رشد تومور

يك متخصص پوست و مو گفت: تومورها و زگیل‌ها مي‌توانند در همه جاي ناخن يافت شوند که در اثر رشد تومور يا زگیل، صفحه ناخن ممکن است دچار تغيير شکل شود يا حتي تخریب شده و از بين برود...

يك متخصص پوست و مو گفت: تومورها و زگیل‌ها مي‌توانند در همه جاي ناخن يافت شوند که در اثر رشد تومور يا زگیل، صفحه ناخن ممکن است دچار تغيير شکل شود يا حتي تخریب شده و از بين برود. دکتر فرشته بيري در گفتگو با ايسنا گفت: تومورهاي ناخن به دو گروه سرطاني و غيرسرطاني (خوش‌خيم) تقسيم مي‌شوند که شايع‌ترين تومورهاي غيرسرطاني، زگیل‌ها هستند. وي افزود: زگیل‌ها عفونت‌هايي ويروسي هستند که پوست اطراف يا زير ناخن را مورد تهاجم قرار مي‌دهند، اغلب اين موارد دردناک هستند و گاهي موجب محدود شدن کاربرد انگشت مبتلا مي‌شوند. درمان آنها ساده، اما طولاني است و معمولا شامل منجمد کردن يا سوزاندن محل با مواد شيميايي و برداشت زگیل است. وي تصريح کرد: اگر زگیل يا تومور به زير چين‌هاي ناخن گسترش يابد يا در زير صفحه ناخن قرار داشته باشد، ممکن است براي برداشت آن نياز به عمل جراحي باشد. اين متخصص پوست و مو درخصوص پسوريازيس ناخن نيز گفت: پسوريازيس يك بيماري مزمن است که سبب التهاب پوست مي‌شود و در نتيجه در پوست سر، آرنج‌ها و زانوها پوسته‌هاي سفید - قره‌اي و ضخيم تشکيل مي‌شود. شيوع آن حدود يك درصد و ممکن است در ايران 700 هزار نفر در دوره‌اي از عمر خود مبتلا به پسوريازيس شوند. وي عنوان کرد: پسوريازيس در 50 درصد بيماران اعم از بچه‌ها، بالغان و بزرگسالان علاوه بر پوست، ناخن‌ها را هم گرفتار مي‌کند، البته اين گرفتاري به شدت و وسعت پسوريازيس در بدن ارتباطي ندارد.