



آسپرین موجب کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات می شود

به گفته محققان، مردانی که به طور منظم آسپرین مصرف می کنند کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات قرار دارند.

به گفته محققان، مردانی که به طور منظم آسپرین مصرف می کنند کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به وجود ارتباط بین مصرف آسپرین و کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات پی بردند.

دکتر کریستوفر آلارد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم که مصرف منظم آسپرین بعد از تشخیص ابتلا به سرطان پروستات در فرد، موجب کاهش احتمال مرگ ناشی از این سرطان تا ۴۰ درصد می شود.»

با این حال وی در ادامه می افزاید: «هنوز زود است که آسپرین را برای پیشگیری از ابتلا به سرطان کشنده پروستات توصیه کنیم، اما مردان مبتلا به این سرطان که تاکنون از فواید قلبی عروقی آسپرین بهره برده اند، یک دلیل دیگر برای مصرف منظم آسپرین خواهند داشت.»

به گفته آلارد، توانایی آسپرین در توقف تولید پلاکت های خونی ممکن است دلیل نحوه تاثیر آن در پیشگیری از روند پیشرفت سرطان پروستات باشد.

آلارد در این باره اظهار داشت: «احتمالا کاهش پلاکت های خونی این امکان را برای سیستم ایمنی فراهم می آورد تا سلول های سرطانی را تشخیص داده و با آنها مقابله نماید.»