


ارتباط کاهش شنوایی با بیماری کلیوی

یک مطالعه که به تازگی انجام شده نشان می دهد افراد مسن مبتلا به بیماری خفیف کلیوی در معرض کاهش شنوایی قرار دارند و به همین خاطر باید از نظر شنوایی تحت غربالگری قرار گیرند.



یک مطالعه که به تازگی انجام شده نشان می دهد افراد مسن مبتلا به بیماری خفیف کلیوی در معرض کاهش شنوایی قرار دارند و به همین خاطر باید از نظر شنوایی تحت غربالگری قرار گیرند.

به گزارش ایرنا ، این مطالعه که بر روی افراد 50 ساله و بالاتر انجام شد نشان می دهد، 54 درصد افراد مبتلا به بیماری خفیف کلیوی تا حدودی کاهش شنوایی نیز داشتند و 30 درصد دچار کاهش شدید شنوایی شدند. طبق اعلام موسسه ملی ناشنوایی و سایر اختلالات ارتباطاتی، 18 درصد افراد 45 تا 64 ساله در آمریکا به کاهش شنوایی مبتلا هستند.

مطالعات اولیه نشان داده بود که بیماری کلیوی با کاهش شنوایی در برخی انواع سندرم های نادر ارتباط دارد. اما این مطالعه جدید که در مجله آمریکایی Kidney Diseases منتشر شده ، نشان می دهد که این ارتباط می تواند برای تمام افراد مسن مبتلا به بیماری کلیوی وجود داشته باشد.

در آمریکا 31 میلیون فرد بزرگسال مبتلا به بیماری کلیه وجود دارد که 7.5 میلیون نفر از آنها شکل خفیف این بیماری را دارند. با توجه به یافته های جدید محققان معتقدند که برای این بیماران مهم است که از ارتباط میان بیماری خود و کاهش شنوایی اطلاع داشته باشند.